

MONITORING KOMARACA

Zavod za javno zdravstvo Sombor u okviru Interreg-IPA projekta Hrvatska-Srbija „Kontrola komaraca u pograničnom području“ (MOS-Cross), vršio je monitoring odraslih formi (određivanje brojnosti i vrste) komaraca na teritoriju Zapadnobačkog okruga 12. i 26. srpnja na 52 postaje sa dve vrste klopki: BG Sentinel i CDC. Na još 10 postaja vršen je 24-satni monitoring brojnosti i aktivnosti komaraca, i to od 20. srpnja svakodnevno.

Povećan broj kućnih formi komaraca izmjereno je na mjernim postajama: Prigrevica, Sivic, Bezdan, Ekološki centar „Kice“, Šebešfok, TPC u Šikari, Kolut, Bački Monoštor, Bački Gračac, Doroslovo i u Somboru (Selenča).

Dvadesetčetvorosatni monitoring brojnosti i aktivnosti komaraca vršen je na teritoriju grada Sombora. Iznimno velika brojnost komaraca zabilježena je na lokaciji ZZJZ Sombor, „Spot“ (Subotički put), Centar Sombor i na UPOV u Rokovcima. Komarci su bili najaktivniji u večernjim satima. Na svim lokacijama preovladavaju kućni komarci (*Culex pipiens*), kao i ukupnoj brojnosti preko 90 odsto. Razvojni ciklus je isti za sve komarce i ovisno o temperaturi traje od 10 do 14 dana (i dulje ukoliko je hladnije vrijeme) od jajeta do odraslog komarca. Ono što je karakteristično za pripadnike roda kuleks jest da se oni mogu razvijati na terasama, u vrtovima, umivaonicama, šahtovima i septičkim jamama u neposrednoj blizini naših domova. Iz tog razloga je bitno da građani uklone svu stajaću vodu iz svoje okoline, da ne čuvaju vodu u kantama ili bačvama, a ukoliko to čine, da je obavezno mijenjaju na pet dana. ZZJZ Sombor u toku narednih dana izvršit će analize komaraca na prisustvo virusa Zapadnog Nila, te će nakon izvršenih analiza saopćiti javnosti rezultate analiza. Monitoring odraslih vrsta komaraca nastavlja se tijekom kolovoza. ZZJZ Sombor preporučuje suzbijanje odraslih formi komaraca na lokacijama sa visokom brojnošću.



**Prim. mr sc. med. dr Dragoslava
Čubrilo, specijalist higijene, ravnatelj
Centra za higijenu i humanu
Ekologiju**

KAKO SE ZAŠTITITI?

Izlaskom u prirodu nosite odjeću dugih rukava i koristite odgovarajuće repelente kao zaštitu od uboda komaraca, posebno u sumrak i prije zore, kada su komarci i najaktivniji. Postavite mreže protiv komaraca na prozore i vrata. Uklonite sve stare gume, limenke, staklenke, pladnjeve, posude i sve druge predmete koji mogu zadržati vodu potrebnu za odlaganje jaja i za daljnji razvoj ličinki, koje se nalaze u blizini stambenih zgrada ili domova u prirodi.